

この添付文書は服用前に必ずお読みください。  
また、必要時に読めるよう本剤とともに保管してください。

トラネキサム酸配合

第②類医薬品

# ノスポール咳止め液Z

ノスポール咳止め液Zは、せき中枢に作用してせきをしずめるジヒドロコデインリン酸塩、グアヤコールスルホン酸カリウムなどの鎮咳去たん成分に加えて、痛み・はれを抑えるトラネキサム酸を配合し、のどの痛みをとまなうせき・たんによく効きます。

## ⚠ 使用上の注意



### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。  
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。  
(眠気等があらわれることがあります。)
3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。
4. 過量服用・長期連用しないでください。



### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - (1) 医師の治療を受けている人
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
  - (3) 高齢者
  - (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - (5) 次の症状のある人  
高熱、排尿困難
  - (6) 次の診断を受けた人  
心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害、血栓のある人(脳血栓、心筋梗塞、血栓性静脈炎)、血栓症を起こすおそれのある人、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむげ、のどの痛み等があらわれる。
呼吸抑制	息切れ、息苦しさ等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
便秘、口のかわき、眠気
4. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

### ■効能・効果

のどの痛みをとまなうせき・たん

## ■用法・用量

次の量を添付の目盛りつき計量カップではかり、食後及び必要に応じて就寝前に服用してください。また場合により、約4時間の間隔をおいて1日6回まで服用できます。

年 齢	1回服用量	1日服用回数
15歳以上	10 mL	3～6回
12歳以上15歳未満	6 mL	
11歳未満	服用しないこと	

## <用法・用量に関連する注意>

- (1)定められた用法及び用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

## ■成分・分量

60mL(15歳以上の1日最大服用量)中

成 分	分 量	は た ら き
ジヒドロコデインリン酸塩	30 mg	せきをしずめる
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	75 mg	
トラネキサム酸	420 mg	のどの痛みを和らげる
グアヤコールスルホン酸カリウム	270 mg	たんを排出しやすくする
クロルフェニラミンマレイン酸塩	12 mg	せきをしずめる
キキョウ流エキス (キキョウ600 mgに相当)	0.6 mL	たんを排出しやすくする
セネガ流エキス (セネガ600 mgに相当)	0.6 mL	

添加物として白糖、D-ソルピトール、安息香酸Na、パラベン、エタノール、カラメル、香料、グリセリン、バニリン、プロピレングリコールを含有します。

## ■保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)服用後はビンの口をよく拭き、フタをしっかりとしめてください。しめ方が悪いと内容液が流れ出たり汚染することがあります。
- (5)計量カップは、服用後よく水洗いし、本剤とともに清潔に保管してください。
- (6)一度開封した後は、品質保持の点からなるべく早めに服用してください。
- (7)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

## ■お願い

キャップがかたいときはビンの中にお湯が入らないように注意しながらキャップ部分をお湯(50～60℃)であたためてください。その際、お湯の温度が高すぎるとやけどしたり瓶が割れてけがをすることがありますので十分ご注意ください。

## ■お問い合わせ先

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までお願いします。  
日野薬品工業株式会社 お客様相談窓口  
電話：0748-52-1232 受付時間：9時～17時(土、日、祝日を除く)

発売元

**協和薬品工業株式会社**  
岐阜県岐阜市野一色二丁目8番6号

製造販売元

**日野薬品工業株式会社**  
滋賀県蒲生郡日野町上野田119